



Cantidad de encuestados: 4042; edad: 51,1 ± 16,7 ; rango: 2 - 91




Sexo	N	Edad ± desvío estándar
Femenino	2688 (66,5%)	50,5 ± 16,4
Masculino	1354 (33,5%)	52,3 ± 17,2

Distribución por provincia




DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD:


Edad	Femenino	Masculino	Total
Menos de 10	13	17	30
10 - 19	121	39	160
20 - 29	280	133	413
30 - 39	379	192	571
40 - 49	769	294	1063
50 - 59	1085	501	1586
60 - 69	689	373	1062
70 - 79	404	237	641
80 y más	80	70	150
Total	3820	1856	5676



CONOCIMIENTO SOBRE GLAUCOMA:



ÚLTIMO CONTROL DE PRESIÓN INTRAOCULAR:




FACTORES DE RIESGO PARA GLAUCOMA:

Factores de riesgo	Total (% del total)
Anteced. fliar. directo (*)	583 (14,4%)
Diabetes	613 (15,2%)
Problemas p. arterial	1218 (30,1%)
Edad mayor a 40	3105 (76,8%)
Cirugía (**)	226 (5,6%)
Láser	117 (2,9%)
Corticoides	442 (10,9%)
Accidentes	277 (6,9%)

(*) Nota: se consideró familiar directo: padres, hermanos, hijos o cualquier combinación de los mismos

Gráfico 6

(**) Nota: en 118 casos encuestados en el Hospital Ramos Mejía no se respondió esta pregunta.



PRESIÓN INTRAOCULAR SEGÚN OJO MÁS GRAVE. UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE.


Ojo más grave	Total	% del total
Normal	3580	88,6%
20 - 25	359	8,9%
Mayor de 25	77	1,9%
Sin dato	26	0,6%
Total	4042	

Los pacientes en los que se contaba con datos de un solo ojo se consideró dicho dato.


CLASIFICACIÓN DE PAPILAS SEGÚN OJO MÁS GRAVE . UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE.

Papila más grave	Total	% del total
Normal	2825	69,9%
Sospechosa	513	12,7%
Patológica	169	4,2%
Sin dato	535	13,2%
Total	4042	

PACIENTES CON PRESIÓN INTRAOCULAR MAYOR O IGUAL A 20.




PACIENTES CON PAPILA SOSPECHOSA O PATOLÓGICA.




PRESIÓN INTRAOCULAR VS CLASIFICACIÓN DE PAPILA UNIDAD DE ANÁLISIS: OJO. NO SE CONSIDERARON LOS FALTANTES DE DATOS


Presión intraocular	Papila			Total
	Normal	Sospechosa	Patológica	
Normal	2665	345	86	3096
20 - 25	143	135	38	316
Mayor de 25	3	26	43	72
Total	2811	506	167	3484



ANTECEDENTE FAMILIAR DIRECTO+DIABETES: DISTRIBUCIÓN SEGÚN PRESIÓN INTRAOCULAR EN EL OJO MÁS GRAVE. UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE. No se consideraron los faltantes de datos




ANTECEDENTE FAMILIAR DIRECTO+DIABETES: DISTRIBUCIÓN SEGÚN PAPILAS EN EL OJO MÁS GRAVE. UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE. No se consideraron los faltantes de datos



PRESIÓN INTRAOCULAR MAYOR O IGUAL A 20 SEGÚN GRUPO ETARIO.

Edad	Presión intraoc. mayor o igual a 20	Total por grupo etario	% del grupo etario
Menos de 10	2	29	6,9%
10 - 19	8	136	5,9%
20 - 29	17	336	5,1%
30 - 39	40	436	9,2%
40 - 49	79	756	10,4%
50 - 59	124	1021	12,1%
60 - 69	96	761	12,6%
70 - 79	52	456	11,4%
80 y más	18	111	16,2%
Total	436	4042	



USO DE ANTEOJOS

Anteojos	Total	% del total
Médico oculista	2510	62,1%
Óptico	59	1,5%
Sin receta	110	2,7%
Otro	21	0,5%
No usa	1342	33,2%
Total	4042	

