



Cantidad de encuestados: 4299; edad: 51,7 ± 16,4; rango: 5 - 95




Sexo	N	Edad ± desvío estándar
Femenino	2901 (67,5%)	50,8 ± 15,9
Masculino	1398 (32,5%)	53,6 ± 17,2

Distribución por provincia




DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD:


<i>Edad</i>	<i>Femenino</i>	<i>Masculino</i>	<i>Total</i>
Menos de 10	4	8	12
10 - 19	77	48	125
20 - 29	267	95	362
30 - 39	331	134	465
40 - 49	575	218	793
50 - 59	731	335	1066
60 - 69	570	278	848
70 - 79	285	236	521
80 y más	61	46	107
Total	2901	1398	4299



CONOCIMIENTO SOBRE GLAUCOMA:




ÚLTIMO CONTROL DE PRESIÓN INTRAOCULAR:



FACTORES DE RIESGO PARA GLAUCOMA:

<i>Factores de riesgo</i>	<i>Total (% del total)</i>
Anteced. fliar. directo (*)	605 (14,1%)
Diabetes	624 (14,5%)
Problemas p. arterial	1167 (27,1%)
Edad mayor a 40	3355 (77,6%)
Cirugía	243 (5,7%)
Láser	120 (2,8%)
Corticoides	386 (9,0%)
Accidentes	260 (6,0%)
Anteojos permanentes	1228 (28,6%)



(*) Nota: se consideró familiar directo: padres, hermanos, hijos o cualquier combinación de los mismos.

PRESIÓN INTRAOCULAR SEGÚN OJO MÁS GRAVE. UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE.


Ojo más grave	Total	% del total
Normal	3800	88,4%
20 - 25	358	8,3%
Mayor de 25	55	1,3%
Sin dato	86	2,0%
Total	4299	

Los pacientes en los que se contaba con datos de un solo ojo se consideró dicho dato.


CLASIFICACIÓN DE PAPILAS SEGÚN OJO MÁS GRAVE . UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE.

Papila más grave	Total	% del total
Normal	2777	64,6%
Sospechosa	604	14,0%
Patológica	178	4,1%
Sin dato	740	17,2%
Total	4299	

PACIENTES CON PRESIÓN INTRAOCULAR MAYOR O IGUAL A 20.




PACIENTES CON PAPILA SOSPECHOSA O PATOLÓGICA.




PRESIÓN INTRAOCULAR VS CLASIFICACIÓN DE PAPILA UNIDAD DE ANÁLISIS: OJO. NO SE CONSIDERARON LOS FALTANTES DE DATOS


<i>Presión intraocular</i>	<i>Papila</i>			<i>Total</i>
	<i>Normal</i>	<i>Sospechosa</i>	<i>Patológica</i>	
<i>Normal</i>	2625	424	103	3152
<i>20 - 25</i>	116	158	47	321
<i>Mayor de 25</i>	12	17	24	53
<i>Total</i>	2753	599	174	3526



ANTECEDENTE FAMILIAR DIRECTO+DIABETES: DISTRIBUCIÓN SEGÚN PRESIÓN INTRAOCULAR EN EL OJO MÁS GRAVE. UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE. No se consideraron los faltantes de datos




ANTECEDENTE FAMILIAR DIRECTO+DIABETES: DISTRIBUCIÓN SEGÚN PAPILAS EN EL OJO MÁS GRAVE. UNIDAD DE ANÁLISIS: PACIENTE. No se consideraron los faltantes de datos



PRESIÓN INTRAOCULAR MAYOR O IGUAL A 20 SEGÚN GRUPO ETARIO.

<i>Edad</i>	<i>Presión intraocular mayor o igual a 20</i>	<i>Total por grupo etario</i>	<i>%del grupo etario</i>
Menos de 10	0	12	0,0%
10 - 19	3	125	2,4%
20 - 29	23	362	6,4%
30 - 39	40	465	8,6%
40 - 49	73	793	9,2%
50 - 59	101	1066	9,5%
60 - 69	99	848	11,7%
70 - 79	68	521	13,1%
80 y más	6	107	5,6%
Total	413	4299	



USO DE ANTEOJOS

<i>Anteojos</i>	<i>Total</i>	<i>% del total</i>
Médico oculista	2675	62,2%
Óptico	42	1,0%
Sin receta	99	2,3%
Otro	70	1,6%
No usa (*)	1413	32,9%
Total	4299	

