



CAO | Consejo Argentino de Oftalmología

Campaña Nacional de Detección del Glaucoma 2014

Campaña 2014: Datos generales



Rango de edades: **2 a 98 años**

Promedio de edad: **48,5 años**


Total de pacientes: **5349**

Total de ojos estudiados: **10698**


Total de ojos a los que se le midió PIO: **10599**

Total de papilas estudiadas: **9703**


Total de ojos con datos completos (PIO y Clasificación de papilas): **4801**



Pacientes encuestados por provincia




Distribución por edad




¿Sabe qué es el glaucoma?

¿Sabe?	Cantidad	%
Sin datos	54	1,01%
Si	2240	41,88%
No	3055	57,11%
Total	5349	100%




Último control de PIO

Último control PIO	Total
Sin datos	59
Nunca	2559
Menos de 2 años	1725
De 2 a 5 años	578
Más de 5 años	428
Total	5349



Factores de riesgo para glaucoma

Factores de riesgo	Total	% del total
Edad 40 o más	3862	72,20%
Antec. fliar. directo (*)	784	14,66%
Diabetes	696	13,01%
Anteojos permanentes	1596	29,84%
Cirugía	379	7,09%
Láser	177	3,31%
Corticoides	529	9,89%
Accidentes	307	5,74%
	5349	




PIO según ojo más grave

Ojo más grave	Total	%
Sin datos	32	0,60%
Normal	4909	91,77%
20 - 25	346	6,47%
Mayor de 25	62	1,16%
Total	5349	100%


Papila según ojo más grave

Papila más grave	Cant.	%
Sin datos	492	9,20%
Normal	3667	68,55%
Sospechosa	822	15,37%
Patológica	234	4,37%
No registrable	134	2,51%
Total	5349	100%

Pacientes con PIO mayor o igual a 20




Pacientes con papila sospechosa o patológica



Presión intraocular vs. clasificación de papila

(Unidad de análisis: ojo. No se toman en cuenta faltantes de datos)

Presión intraocular	Clasificación de papila			Total
	Normal	Sospechosa	Patológica	
Normal	7571	1521	407	9499
20 - 25	0	0	1	1
Mayor de 25	0	0	0	0
Total	7571	1521	408	9500



Antecedente familiar directo + diabetes: distribución según PIO en ojo más grave

AFD + DBT	Cantidad según PIO
Normal	88
20 - 25	8
Mayor de 25	0
Total	96

Antecedente familiar directo + diabetes: distribución según papilas en ojo más grave


AFD + DBT	Cantidad según papila
Normal	62
Sospechosa	17
Patológica	2
Total	81

PIO mayor o igual a 20 según grupo etario

Edad	Total de casos	Total con datos	PIO mayor o igual a 20	%del grupo etario
0 a 9	32	32	2	6,25%
10 a 19	218	217	15	6,91%
20 a 29	504	498	35	7,03%
30 a 39	706	699	45	6,44%
40 a 49	1041	1034	88	8,51%
50 a 59	1293	1286	101	7,85%
60 a 69	919	915	76	8,31%
70 a 79	497	496	40	8,06%
80 y más	112	112	6	5,36%
Total	5322	5289	408	64,72%

Uso de anteojos

Anteojos	Cantidad
Sin datos	61
No usa	2014
Médico oculista	2994
Óptico	64
Sin receta	179
Otro	37
Total	5349



¡Muchas gracias!

Consejo Argentino de Oftalmología