

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL ESTRABISMO EN EL NIÑO

(Leyes 26.529 y 26742 y Decreto Reglamentario 1089/2012)

Nota: El diseño y contenido de este consentimiento, evaluado y aprobado por el Consejo Argentino de Oftalmología, es autoría del Dr. Roberto Borrone. Su texto original no debe ser modificado.

DERECHO A NO RECIBIR INFORMACIÓN SANITARIA

Ejercemos nuestro derecho a no recibir información sanitaria vinculada a patología ocular de nuestro hijo/a, los procedimientos diagnósticos relacionados ni los tratamientos planificados.

Firma del padre
DNI _____

Firma del profesional
DNI _____

Autorizamos a disponer de la información sanitaria vinculada a la patología ocular de nuestro hijo/a y a decidir sobre su tratamiento a _____
DNI _____

Firma del padre
DNI _____

Firma de la madre
DNI _____

1) Constancia de recepción del formulario

En el día de la fecha, _____, hemos recibido del oftalmólogo de nuestro hijo/a, el Dr. _____, este formulario que contiene información sobre su enfermedad ocular (estrabismo), el tratamiento que ha propuesto, sus riesgos y las otras posibilidades alternativas terapéuticas que existen. Luego de leer en nuestra casa detenidamente con nuestros familiares esta información, hemos sido citados el día _____ para que el oftalmólogo de nuestro hijo/a aclare todas nuestras dudas.

2) ¿Qué es el estrabismo?

Un niño tiene estrabismo cuando tiene los ojos “desviados”. Normalmente, cuando dirigimos la mirada hacia algo que nos interesa, por ejemplo, un árbol, nuestros dos ojos “apuntan” al árbol. Cada ojo funciona como una filmadora y la imagen captada por cada ojo viaja hacia el cerebro.

Como estas dos imágenes del árbol son muy parecidas (no son idénticas), el cerebro las puede mezclar en una imagen única. Esta imagen única es en relieve, tiene tres dimensiones gracias a esa pequeña diferencia con que cada ojo “filmó” al árbol. En el estrabismo, un ojo “apunta” al árbol pero el otro ojo (el desviado) no tiene al árbol en el centro de la imagen. Esto significa que la imagen que llega al cerebro desde cada ojo es muy diferente. El cerebro no puede mezclarlas para formar una imagen única con relieve.

En el caso de los niños el cerebro elige la imagen que viene del ojo dominante y anula la imagen que viene del ojo desviado. Esto tiene dos consecuencias: 1) el niño tendrá dificultad para “ver en relieve” (no hay estereopsis); 2) si desvía siempre el mismo ojo, este ojo no puede desarrollar su capacidad visual quedando con una visión disminuida (esto se llama ambliopía).

A estas dos consecuencias hay que agregar el problema estético de un niño “bizco” o con “ojos desviados y su posible impacto psicológico y en su vida de relación.

3) ¿En qué consiste la cirugía del estrabismo?

El primer punto que se debe aclarar es que se trata de una cirugía que se efectúa por fuera del ojo. El cirujano no penetra dentro del ojo.

Básicamente, lo que hace el cirujano es debilitar y/o reforzar los músculos que mueven al ojo en las distintas posiciones de la mirada. Cada ojo tiene seis (6) músculos externos que se unen a su pared blanca (esclera). La cantidad de músculos que el cirujano opera depende del tipo de estrabismo y de la magnitud desviación.

Otro punto importante es que en muchos casos, a pesar que el ojo que se desvía es siempre el mismo, el cirujano debe operar músculos de los dos ojos.

Los músculos actúan como riendas, por ejemplo, para mirar hacia la derecha; hay músculos que se contraen “tirando” de los ojos y rotándolos hacia la derecha, mientras que, al mismo tiempo, otros músculos se relajan (los que se relajan son los encargados de rotar los ojos hacia la izquierda).

En los niños, esta cirugía se realiza bajo anestesia general.

Es muy importante cumplir con los análisis y estudios prequirúrgicos y la evaluación final por el pediatra antes de la cirugía.

4) Beneficios que se esperan conseguir con la cirugía del estrabismo.

Explicamos previamente que el niño con estrabismo tiene tres problemas:

- a) El problema estético
- b) Su dificultad para “ver con relieve” (no tiene estereopsis): al centro visual del cerebro le cuesta “armar una imagen con las tres dimensiones”, esto crea cierta dificultad, por ejemplo, para calcular la distancia que hay entre los objetos o tener sensación de profundidad.
- c) No hay cooperación entre los ojos: puede quedar con una disminución definitiva de la visión de un ojo si desvía siempre el mismo ojo y su cerebro anula siempre la imagen que viene de ese ojo desviado (ambliopía).

De estos tres problemas, la cirugía puede mejorar mucho el problema estético; puede mejorar un poco la cooperación entre los ojos; pero no mejora la visión.

Si un niño desvía siempre el mismo ojo (estrabismo no alternante), sólo tapando el “ojo bueno” se podrá mejorar la visión del ojo desviado (oclusión).

El oftalmólogo determinará la cantidad de horas que es necesario tapar el ojo bueno (en ciertos casos se tapan los ojos en forma alternada). Es muy importante comenzar la oclusión precozmente para intentar equilibrar la visión de ambos ojos antes de la cirugía.

5) RIESGOS Y / O COMPLICACIONES POSIBLES EN LA CIRUGÍA DEL ESTRABISMO.

UN CONCEPTO IMPORTANTE: NO EXISTE NINGUNA CIRUGÍA SIN RIESGOS.

En ciertos casos se producen complicaciones que pueden ser leves, moderadas o graves. Pueden ocurrir en cirugías perfectamente realizadas por los cirujanos más expertos.

Nadie puede garantizarle una cirugía exitosa.

Para informarlos en forma clara y que ustedes puedan tomar una decisión con el conocimiento necesario les brindamos un LISTADO PARCIAL pero con las complicaciones más graves y/o las más frecuentes:

- A. **Riesgos propios de la ANESTESIA GENERAL:** en los niños es imprescindible la anestesia general para operar el estrabismo. Todos sabemos que esto genera un riesgo de vida aunque esta posibilidad es muy remota y excepcional.
- B. **INFECCIÓN INTERNA DEL OJO (ENDOFTALMITIS):** es una complicación muy poco frecuente, pero cuando ocurre, puede provocar la pérdida de la visión del ojo a pesar de aplicarse un tratamiento precoz y correcto. La frecuencia es menor a 1 caso cada 10.000 cirugías. Puede ocurrir sin que se produzca una perforación de la pared ocular (esclera) durante la cirugía. Es excepcional que esté vinculada a la llamada “infección de quirófano” o “infección hospitalaria”. Los gérmenes que provocan infecciones en ojos operados viven habitualmente en los tejidos que rodean al ojo del propio paciente.
- C. **DESVIACIÓN DE LOS OJOS POSTOPERATORIA:** este resultado estético no satisfactorio ocurre en 10 a 20% de las cirugías. El sentido de la desviación puede ser el mismo que el preoperatorio o puede ser inverso (por ejemplo: en lugar de desviar “hacia adentro”, luego de la cirugía desvía “hacia fuera”). El estrabismo postoperatorio puede ocurrir tanto inmediatamente luego de la cirugía, como sobrevenir meses ó años después. Muchos de estos casos requieren una nueva cirugía y, en ciertos casos, más de una re-operación. La mayoría de estos casos en que queda una desviación postoperatoria son el resultado inevitable de la variabilidad de respuesta entre los pacientes a pesar de un tratamiento correcto. Puede también obedecer a un desplazamiento muscular postoperatorio.
- D. **VISIÓN DOBLE POSTOPERATORIA (DIPLOPIA):** En muchos casos es transitoria. Se puede tratar con anteojos comunes, con anteojos con prismas, con gotas o con ejercicios visuales (ejercicios ortópticos). Cuando permanece, puede ser necesaria una nueva cirugía. Se debe a que el cerebro, al recibir una nueva información de los ojos, no logra unificar las imágenes.
- E. **POSICIÓN ALTERADA DE LOS PÁRPADOS.** Un párpado puede quedar más alto ó más bajo como consecuencia de la cirugía necesaria para intentar “enderezar” los ojos. Esto se debe a la relación íntima que hay entre los músculos operados y los párpados.
- F. **REACCIÓN INUSUAL A LA SUTURA:** el ojo forma un tejido que engloba a la sutura como una respuesta ante un “cuerpo extraño”. Con los materiales de sutura actuales, es una complicación poco frecuente. Puede requerir una cirugía para remover dicho tejido.
- G. **INFLAMACIÓN Y/O INFECCIÓN DE LOS TEJIDOS QUE RODEAN AL OJO (CELULITIS ORBITARIA):** es una complicación muy poco frecuente que, en casos muy agresivos, puede poner en riesgo la vida del paciente.
- H. **HEMORRAGIA INTERNA DEL OJO (hemorragia vítrea):** es una complicación poco frecuente, provocada en general por una microperforación de la pared del ojo (esclera) durante la cirugía. Según las estadísticas científicas, estas microperforaciones ocurren en el 1% al 10% de las cirugías. Sólo algunas generan una hemorragia. Ocurren al separar

los músculos del ojo o al suturarlos en su nueva posición. Determinadas características de la pared del ojo (extrema delgadez) pueden favorecer que esto ocurra. En algunos casos la sangre se reabsorbe espontáneamente; en otros puede ser necesario una cirugía en el interior del ojo llamada vitrectomía. Existe un riesgo remoto de pérdida de la visión a pesar de un tratamiento oportuno y correcto.

- I. **DESPRENDIMIENTO DE RETINA EN EL POSTOPERATORIO:** se debe habitualmente a las mismas causas que la hemorragia vítrea. Requiere una cirugía para intentar recolocar la retina en su lugar. En ciertos casos puede ser necesaria más de una re-intervención. En casos muy severos puede llevar a la pérdida de la visión a pesar de un tratamiento oportuno y correcto.
- J. **ALTERACIÓN GRAVE DE LA CIRCULACIÓN DEL OJO** (isquemia del segmento anterior del ojo). Complicación muy grave y muy poco frecuente (1 caso cada 10.000). Entre sus causas están el número de músculos vecinos de un ojo que son desinsertados del ojo y cierta insuficiencia circulatoria de un ojo en particular. Puede llevar a la pérdida de la visión a pesar de un tratamiento oportuno y correcto.

Controles postoperatorios

Su hijo será controlado al día siguiente de la cirugía. Es normal que el ojo tenga el aspecto de una conjuntivitis: “lo blanco del ojo” estará rojo y puede haber secreción. Los párpados pueden estar “hinchados”. Se le indicarán gotas. De acuerdo con la evolución será el siguiente plan de controles.

Ustedes pueden colaborar con el control postoperatorio: si existe alguno de estos signos ó síntomas lleve inmediatamente a su hijo para un control:

- si aparece dolor o aumentan las molestias;
- si aumenta la “hinchazón” o se ponen más rojos los párpados;
- si aumenta la secreción del ojo;
- si su hijo le dice que ve menos.

6) ¿Existen otras alternativas terapéuticas para el estrabismo?

En cierto tipo de estrabismos (estrabismos acomodativos) se pueden “enderezar” los ojos mediante anteojos comunes. Algunos de estos casos necesitan cirugía porque los anteojos no pueden eliminar totalmente la desviación (estrabismos parcialmente acomodativos). Ciertos estrabismos no permanentes pueden mejorar con ejercicios visuales (ejercicios ortópticos). En ciertos estrabismos con una desviación muy pequeña se pueden utilizar anteojos con prismas. En ciertos casos se utilizan gotas.

7) ¿Qué ocurre si no se interviene quirúrgicamente el estrabismo cuando está indicada la cirugía?

Si el estrabismo de un niño no es operado en el momento oportuno se perderá la oportunidad de lograr una mejor cooperación entre ambos ojos.

El problema estético de un niño con estrabismo puede tener influencia en lo psicológico y en su vida de relación.

8) Características particulares que presenta el caso del niño:

9) Espacio para anotar dudas o preguntas

10) Autorización del consentimiento informado

Habiendo recibido este formulario con tiempo suficiente para su estudio y habiendo aclarado satisfactoriamente todas nuestras dudas, nuestras firmas al pie certifican que damos voluntariamente nuestra autorización (consentimiento) para que se le realice a nuestro hijo/a una cirugía de estrabismo en su ojo _____ por el equipo médico constituido por los doctores _____

Firma del padre: _____

Aclaración: _____

DNI: _____

Firma de la madre: _____

Aclaración: _____

DNI: _____

11) Fotografías y/o videos de la cirugía con finalidad científico-técnica:

El paciente SI / NO AUTORIZA al equipo médico a obtener fotografías, videos o registros gráficos para difundir resultados ó iconografía en Publicaciones Médicas y/o ámbitos científicos preservando su identidad.- (Rodear con un círculo la opción elegida).-

Firma del padre: _____

Aclaración: _____

DNI: _____

Firma de la madre: _____

Aclaración: _____

DNI: _____

12) Revocación del consentimiento informado

Hemos decidido voluntariamente anular el consentimiento informado otorgado para que el equipo _____ integrado _____ por _____ los _____ Dres. _____ para que le efectuaran a nuestro hijo/a una cirugía de estrabismo en su ojo _____. Dejamos constancia que se nos ha informado sobre las consecuencias previsibles generadas por esta decisión, (detalladas en el ítem 7 del presente formulario de Consentimiento Informado).

Firma del padre: _____

Aclaración: _____

DNI: _____

Fecha: _____

Firma de la madre: _____

Aclaración: _____

DNI: _____

Fecha: _____

Firma del médico: _____