

# CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA POR DIABETES 2023

---




**CAO** CONSEJO ARGENTINO  
DE OFTALMOLOGÍA

# Datos Generales de la Campaña 2023




## 1699 encuestados de entre 5 y 96 años Edad promedio 56,1 años

■ Masculino ■ Femenino



Sexo	Cantidad	%
Masculino	690	40,6%
Femenino	1009	59,4%
Total	1862	100%

## Distribución por edad




Edad	M	F	Total
Sin dato	0	1	1
Hasta 20	14	16	30
20 - 29	12	26	38
30 - 39	28	68	96
40 - 49	104	167	271
50 - 59	223	345	568
60 - 69	206	244	450
70 - 79	90	117	207
80 y más	13	25	38
Total	690	1009	1699


## Pacientes encuestados por provincia

Provincia	Cant.	%
Buenos Aires	279	16,4%
CABA	78	4,6%
Córdoba	22	1,3%
Corrientes	123	7,2%
Entre Ríos	135	7,9%
Formosa	19	1,1%
Jujuy	203	11,9%
La Pampa	21	1,2%
La Rioja	89	5,2%
Mendoza	12	0,7%
Misiones	27	1,6%
Neuquén	107	6,3%
Río Negro	33	1,9%
Salta	90	5,3%
San Luis	63	3,7%
Santa Fe	187	11,0%
Santa Cruz	21	1,2%
Santiago del Estero	135	7,9%
Tucumán	55	3,2%
Total	1699	100%

## Detalle de pacientes encuestados por provincia




## Antigüedad de la Diabetes





## Tratamientos (muchos pacientes realizan más de un tratamiento)

Tratamiento previo o actual	Cant.	% del total
<b>Dieta</b>	<b>1117</b>	<b>65,7%</b>
<b>Hipogl. orales</b>	<b>1224</b>	<b>72,0%</b>
<b>Insulina</b>	<b>497</b>	<b>29,3%</b>
<b>Fotocoagulación</b>	<b>86</b>	<b>5,1%</b>
<b>Vitrectomía</b>	<b>30</b>	<b>1,8%</b>




Corticoides	Cant.	%
Si	12	0,7%
No	1687	99,3%
<b>Total</b>	<b>1699</b>	<b>100%</b>




Antiangiogenicos	Cant.	%
Si	62	3,6%
No	1637	96,4%
<b>Total</b>	<b>1699</b>	<b>100%</b>

## Control oftalmológico anterior




## Patologías existentes


Patologías	Cantidad	%
Edema macular	107	6,3%
Ceguera por diabetes	50	2,9%
Glaucoma	107	6,3%
Maculopatía por la edad	56	3,3%
Otra	204	12,0%



## Retinopatía existente



## Prescripciones



# Datos comparados 2001 - 2023



## Cantidad, edad promedio y proporción de encuestados

Año	Pacientes diabéticos	Edad promedio	Proporción de encuestados masculinos
2001	1115	57,6	462 (41%)
2002	612	56,5	249 (41%)
2003	664	57	254 (38%)
2004	1256	57,7	524 (42%)
2005	1562	59,7	646 (41%)
2006	782	58,3	316 (40%)
2007	823	56,9	321 (39%)
2008	711	57,9	275 (39%)
2009	1251	58,1	502 (40%)
2010	791	57,8	310 (39%)
2011	1854	52,8	812 (43,8%)
2012	1094	---	623 (56,9%)
2013	2888	59,4	1192 (41,2%)
2014	634	57,3	261 (41,2%)
2015	2282	56,7	955 (41,8%)
2016	2415	55,7	979 (40,5%)
2017	1737	57,9	700 (40,3%)
2018	2275	54,8	924 (40,6%)
2019	3057	58	1339 (43,8%)
2022	1862	56	732 (39,3%)
2023	1699	56,1	690 (40,6%)


## Cantidad, edad promedio y proporción de encuestados



## Control oftalmológico anterior: antigüedad menor a 5 años

	Menos de 1 año	1 a 4 años
2001	14%	29%
2002	14%	39%
2003	14%	39%
2004	16%	42%
2005	24%	47%
2006	21%	52%
2007	21%	38%
2008	23%	47%
2009	11%	36%
2010	15%	19%
2011	16%	57%
2012	4%	36%
2013	38%	23%
2014	9%	63%
2015	12%	72%
2016	7%	70%
2017	5%	47%
2018	4%	48%
2019	4%	45%
2022	3%	68%
2023	7%	67%

## Detalle control oftalmológico anterior: antigüedad menor a 5 años



## Fotocoagulación previa

Año	Fotocoagulación previa
2001	96 (9%)
2002	85 (14%)
2003	72 (11%)
2004	122 (10%)
2005	118 (8%)
2006	43 (6%)
2007	57 (7%)
2008	52 (7%)
2009	70 (6%)
2010	37 (5%)
2011	158 (8,5%)
2012	94 (8,6%)
2013	255 (8,8%)
2014	28 (4,4%)
2015	195 (8,5%)
2016	200 (8,3%)
2017	158 (9,1%)
2018	141 (6,2%)
2019	205 (6,7%)
2022	138 (7,4%)
2023	86 (5,1%)


## Tratamientos

Año	Dieta	HGO	Insulina	Sin tratamiento
2001	663 (59%)	689 (62%)	181 (16%)	83 (7%)
2002	380 (62%)	368 (60%)	160 (26%)	18 (3%)
2003	360 (54%)	388 (58%)	168 (25%)	46 (7%)
2004	713 (57%)	864 (67%)	246 (20%)	75 (6%)
2005	925 (59%)	1085 (69%)	333 (21%)	91 (6%)
2006	523 (67%)	541 (69%)	144 (18%)	32 (4%)
2007	412 (50%)	509 (62%)	142 (17%)	119 (14%)
2008	474 (67%)	458 (64%)	171 (24%)	66 (9%)
2009	869 (69%)	769 (61%)	260 (21%)	75 (6%)
2010	434 (55%)	482 (61%)	157 (20%)	62 (8%)
2011	280 (15,1%)	1158 (62,5%)	1174 (63,3%)	453 (24,4%)
2012	678 (62%)	764 (69,8%)	280 (25,6)	58 (5,3%)
2013	1676 (58%)	1893 (65,5%)	794 (27,5%)	443 (15,3%)
2014	385 (60,7%)	372 (58,7%)	140 (22,4%)	155 (24,4%)
2015	1656(72,6%)	1711 (75%)	641 (28,1%)	-----
2016	1638(67,8%)	1704 (70,6%)	656 (27,2%)	-----
2017	1233 (71%)	1273 (73,3%)	497 (28,6%)	-----
2018	1469(64,6%)	1651 (72,6%)	598 (26,3%)	-----
2019	2044(66,9%)	2304 (75,4%)	860 (28,1%)	-----
2022	1193 (64,1%)	1495 (80,3%)	537 (28,8%)	-----
2023	1117 (65,7%)	1224 (72%)	497 (29,3%)	-----


## Patologías observadas

Año	Sin retinopatía	FO sin lesiones	RD no prolif. leve o moderada	RD no proliferante severa	RD proliferante	Edema macular	Ceguera por diabetes	Otras patologías oculares
2001	666 (60%)	-----	297 (27%)	62 (6%)	58 (5%)	63 (6%)	20 (2%)	126 (11%)
2002	370 (60%)	-----	111 (18%)	52 (8%)	59 (10%)	26 (4%)	12 (2%)	54 (9%)
2003	390 (59%)	-----	140 (21%)	44 (7%)	50 (7%)	37 (6%)	6 (1%)	58 (9%)
2004	823 (65%)	-----	285 (23%)	68 (5%)	51 (4%)	75 (6%)	11 (1%)	181 (14%)
2005	1084 (69%)	-----	309 (20%)	63 (4%)	49 (3%)	93 (6%)	16 (1%)	292 (19%)
2006	512 (65%)	-----	188 (24%)	34 (4%)	46 (6%)	44 (6%)	6 (1%)	134 (17%)
2007	489 (59%)	-----	191 (23%)	60 (7%)	27 (3%)	42 (5%)	20 (2%)	149 (18%)
2008	429 (60%)	-----	165 (23%)	40 (6%)	25 (3%)	46 (6%)	10 (1%)	77 (11%)
2009	750 (60%)	-----	186 (15%)	50 (4%)	38 (3%)	56 (4%)	15 (1%)	116 (9%)
2010	470 (59%)	-----	149 (19%)	37 (5%)	23 (3%)	39 (5%)	4 (1%)	126 (16%)
2011	1023 (55,2%)	-----	299 (16,1%)	98 (5,3%)	97 (5,2%)	153 (8,3%)	49 (2,6%)	391 (21,1%)
2012	445 (40,7%)	-----	234 (21,4%)	60 (5,5%)	61 (5,6%)	105 (9,6%)	30 (2,7%)	235 (21,5%)
2013	1316 (45,6%)	-----	504 (17,5%)	158 (5,5%)	195 (6,8%)	256 (8,9%)	56 (1,9%)	522 (18,1%)
2014	376 (59,3%)	-----	83 (13,1%)	32 (5%)	16 (2,5%)	27(4,3%)	5 (0,8%)	522 (18,1%)
2015	-----	-----	496 (21,7%)	140 (6,1%)	132 (5,8%)	188 (8,2%)	63 (2,8%)	584 (25,6%)
2016	-----	1251 (51,8%)	452 (18,7%)	140 (5,8%)	144 (6%)	231 (9,6%)	76 (3,1%)	560 (23,2%)
2017	-----	1048 (60,3%)	289 (16,6%)	95 (5,5%)	116 (6,7%)	162 (9,3%)	54 (3,1%)	519 (29,9%)
2018	-----	1490 (65,5%)	341 (15%)	86 (3,8%)	104 (4,6%)	152 (6,7%)	45 (2%)	482 (21,2%)
2019	-----	1956 (64%)	527 (17,2%)	131 (4,3%)	113 (3,7%)	224 (7,3%)	68 (2,2%)	723 (23,7%)
2022	-----	1326 (71,2%)	317 (17%)	107 (5,7%)	112 (6%)	152 (8,2%)	28 (1,5%)	374 (20,1%)
2023	-----	1059 (62,3%)	371 (21,8%)	54 (3,2%)	73 (4,3%)	107 (6,3%)	50 (2,9%)	367 (21,6%)

## Detalle de patologías observadas



## Detalle de patologías observadas



## Fotocoagulación indicada

Año	Fotocoagulación indicada
2001	95 (9%)
2002	67 (11%)
2003	45 (7%)
2004	125 (10%)
2005	82 (5%)
2006	61 (8%)
2007	75 (9%)
2008	38 (5%)
2009	51 (4%)
2010	29 (4%)
2011	98 (5,3%)
2012	94 (8,6%)
2013	211 (7,3%)
2014	27 (4,3%)
2015	177 (7,8%)
2016	244 (10,1%)
2017	182 (10,5%)
2018	152 (6,7%)
2019	219 (7,2%)
2022	187 (10%)
2023	111 (6,5%)

**MUCHAS GRACIAS**



**CAO**

---

CONSEJO ARGENTINO  
DE OFTALMOLOGÍA