

CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN DEL GLAUCOMA 2025

CAO

CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGÍA


DATOS GENERALES

Rango de edades: **6 a 96 años** - Promedio de edad: **51,1 años**

Total de pacientes: **2491** - Total de ojos estudiados: **4982**


Total de ojos a los que se le midió PIO: **4977** - Total de papilas estudiadas: **4902**

Total de ojos con datos completos (PIO y Clasificación de papilas): **4980**




ENCUESTADOS

Género	Cantidad	%
Masculino	793	31,8%
Femenino	1697	68,1%
No binario	1	0,0%
Total	2491	100%




DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA

Provincia	Cantidad	%
CABA	647	25,97%
Bs As	720	28,90%
Catamarca	85	3,41%
Chaco	21	0,84%
Chubut	154	6,18%
Córdoba	36	1,45%
Corrientes	20	0,80%
Entre Ríos	8	0,32%
Jujuy	17	0,68%
La Rioja	42	1,69%
Misiones	58	2,33%
Neuquén	127	5,10%
Rio Negro	104	4,18%
Salta	22	0,88%
Santa Fe	176	7,07%
Santiago del Estero	105	4,22%
Tucumán	149	5,98%
Total	2491	100%




DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y EDAD

Edad	Masculino	Femenino	No binario	Total
Sin dato	0	0	0	0
0 a 19	25	33	1	59
20 a 29	51	141	0	192
30 a 39	65	170	0	235
40 a 49	147	403	0	550
50 a 59	183	431	0	614
60 a 69	188	306	0	494
70 a 79	102	162	0	264
80 y más	32	51	0	83
Total	793	1697	1	2491




CONOCIMIENTO SOBRE GLAUCOMA

¿Sabe?	Cantidad	%
Sin datos	0	0,00%
Si	1228	49,30%
No	1263	50,70%
Total	2491	100%




ÚLTIMO CONTROL DE PRESIÓN INTRAOCULAR

Último control PIO	Total
Sin datos	0
Nunca	1161
Menos de 2 años	856
De 2 a 5 años	279
Más de 5 años	195
Total	2491




USO DE ANTEOJOS

Anteojos	Cantidad
Sin datos	0
No usa	655
Médico oculista	1691
Óptico	39
Sin receta	83
Otro	23
Total	2491



FACTORES DE RIESGO

Factores de riesgo	Total	% del total
Edad 40 o más	2005	80,49%
Antec. fliar. directo (*)	583	23,40%
Diabetes	56	2,25%
Anteojos permanentes	92	3,69%
Cirugía	31	1,24%
Láser	11	0,44%
Corticoides	24	0,96%
Accidentes	12	0,48%
	2491	




No hay datos suficientes ya que no fueron recabados en la totalidad de los pacientes.

PRESIÓN INTRAOCULAR SEGÚN OJO

(unidad de análisis: **ojo**. Total de ojos: **4982**)


Ojos	Total	%
Sin datos	5	0,10%
Normal	4734	95,02%
21 - 25	208	4,18%
26 o más	35	0,70%
Total	4982	100%



PRESIÓN INTRAOCULAR SEGÚN OJO

(unidad de análisis: **paciente**. Se toma como referencia ojo más grave.

Total de pacientes: **2941**).




Ojo más grave	Total	%
Sin datos	2	0,08%
Normal	2323	93,26%
21 - 25	136	5,46%
26 o más	30	1,20%
Total	2491	100%

CLASIFICACIÓN DE PAPILAS SEGÚN OJO

(unidad de análisis: **papilas**. Total de papilas: **4982**)


Papila	Cant.	%
Sin datos	0	0,00%
Normal	3786	75,99%
Sospechosa	737	14,79%
Patológica	234	4,70%
No registrable	225	4,52%
Total	4982	100%



CLASIFICACIÓN DE PAPILAS SEGÚN OJO MÁS GRAVE

(unidad de análisis: **paciente**. Total de pacientes: **2491**).

Papila más grave	Cant.	%
Sin datos	0	0,00%
Normal	1831	73,50%
Sospechosa	431	17,30%
Patológica	138	5,54%
No registrable	91	3,65%
Total	2491	100%



Pacientes con presión intraocular mayor a 20 según factor de riesgo para glaucoma

Factores de riesgo	Pacientes	%
Edad mayor a 40	146	87,95%
Antecedente fliar. directo	50	30,12%
Diabetes	3	1,81%
Anteojos permanentes	3	1,81%
Cirugía	4	2,41%
Láser	1	0,60%
Corticoides	0	0,00%
Accidentes	2	1,20%
Base	166	100%


Pacientes con papila sospechosa o patológica, pacientes con presión intraocular mayor a 20

Calidad	Pacientes	% del total
Presión intraocular mayor o igual a 20	166	6,66%
Papila sospechosa o patológica	229	9,19%
	2491	

PRESIÓN INTRAOCULAR Y CLASIFICACIÓN DE PAPILA

	Clasificación de papila			
Presión intraocular	Normal	Sospechosa	Patológica	Total
Normal	1788	358	95	2241
21 - 25	34	70	24	128
26 o más	7	3	19	29
Total	1829	431	138	2398

PRESIÓN INTRAOCULAR Y CLASIFICACIÓN DE PAPILA (Gráfico)




Distribución de la presión intraocular en ojo más grave según factor de riesgo para glaucoma

(Unidad de análisis: paciente. No se consideran faltantes de datos)

	Presión intraocular						
	Normal		21 - 25		26 o más		Tot.
Edad mayor a 40	1859	92,72%	120	5,99%	26	1,30%	2005
Anteced. fliar. directo (*)	534	92,55%	36	6,24%	7	1,21%	577
Diabetes	53	94,64%	2	3,57%	1	1,79%	56
Anteojos permanentes	88	97,78%	1	1,11%	1	1,11%	90
Cirugía	27	87,10%	2	6,45%	2	6,45%	31
Láser	10	90,91%	0	0,00%	1	9,09%	11
Corticoides	24	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	24
Accidentes	10	83,33%	2	16,67%	0	0,00%	12

Distribución de la presión intraocular en ojo más grave según factor de riesgo para glaucoma (Gráfico)




Distribución de papilas en ojo más grave según factor de riesgo para glaucoma

(Unidad de análisis: **paciente**. No se consideraron los faltantes de datos)

	Clasificación de papilas						
	Normal		Sospechosa		Patológica		Tot.
Edad mayor a 40	1412	73,12%	389	20,15%	130	6,73%	1931
Anteced. fliar. directo (*)	405	72,19%	111	19,79%	45	8,02%	561
Diabetes	33	66,00%	14	28,00%	3	6,00%	50
Anteojos permanentes	60	73,17%	16	19,51%	6	7,32%	82
Cirugía	16	59,26%	6	22,22%	5	18,52%	27
Láser	4	44,44%	4	44,44%	1	11,11%	9
Corticoides	18	78,26%	4	17,39%	1	4,35%	23
Accidentes	7	70,00%	2	20,00%	1	10,00%	10

Distribución de papilas en ojo más grave según factor de riesgo para glaucoma (Gráfico)



**Factor de riesgo “antecedente familiar directo” + “diabetes”,
distribución según PRESIÓN
INTRAOCULAR en el ojo más grave.**

AFD + DBT	Cantidad según PIO
Normal	11
21-25	1
26 o más	0
Total	12

**Factor de riesgo “antecedente familiar directo” + “diabetes”,
distribución según PAPILA en el ojo
más grave.**

AFD + DBT	Cantidad según papila
Normal	6
Sospechosa	3
Patológica	0
Total	9

PRESIÓN INTRAOCULAR MAYOR O IGUAL A 20, SEGÚN EDAD, TOTAL POR GRUPO ETARIO Y % DEL GRUPO ETARIO

Edad	Total de casos	Total con datos	PIO mayor a 20	% del grupo etario
0 a 19	59	57	5	8,47%
20 a 29	192	192	7	3,65%
30 a 39	235	235	8	3,40%
40 a 49	550	550	28	5,09%
50 a 59	614	613	49	7,98%
60 a 69	494	494	36	7,29%
70 a 79	264	264	29	10,98%
80 y más	83	83	4	4,82%
Total	2491	2488	166	6,66%

MUCHAS GRACIAS



CAO

CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGÍA